

Hvem får en genoptræningsplan ved udskrivelse efter stroke?

Maja Thaarup


National rehabiliteringskonference d. 30. september 2024



AALBORG
UNIVERSITET


- Kandidat i Medicin med industriel specialisering
- Ph.d.-studerende hos Dansk Center for Sundhedstjenesteforskning, Klinisk institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital
- Projekt: Ulighed på strokeområdet
- Samarbejde med Hjernesagen, Københavns Universitet og TrygFonden.





TYPES OF STROKE

- ▶ Blødning eller blodprop i hjernen
- ▶ 12,000 rammes af stroke hvert år
- ▶ Ledende årsag til dødelighed og handikap i verden
- ▶ Strokeafsnit og behandling



ISCHEMIC STROKE



**HEMORRHAGIC
STROKE**



**TRANSIENT
ISCHEMIC STROKE**


“Der udarbejdes genoptræningsplan til:

- ▶ alle personer, der har et lægefagligt behov for genoptræning efter udskrivning i forhold til funktionsevnenedsættelse inden for områderne kroppens funktioner og anatomi, aktivitet og deltagelse, relateret til den erhvervede hjerneskade, og hvor personen har behov for professionelle genoptrænings- og/eller rehabiliteringsindsatser i forlængelse af behandlingen på sygehuset.

Der skal ikke udarbejdes genoptræningsplan til:

- ▶ personer, hvor der ikke på udskrivningstidspunktet vurderes at være potentiale for genoptræning og/eller rehabilitering.”

Genoptræning efter stroke



Socioeconomic Inequalities in Functional Outcome After Ischemic Stroke

DANISH MEDICAL JOURNAL

PMCID: [PMC11179759](#)ID: [38529656](#)

Wide variation in function level assessment

Sine Mette Christensen

Grethe Andersen

Abstract

FULL LENGTH ARTICLE · Volume 28, Issue 6, P1529-1536, June 2019

 Download Full Issue

Main Article

Social Inequality by Income in Short- and Long-Term Cause-Specific Mortality after Stroke

▶ [Klaus Kaae Andersen, MS, PhD *](#) · [Tom Skyhøj Olsen, MD, PhD](#)  [Affiliations & Notes](#)  [Article Info](#) 

ABSTRACT

There are no standardized instruments to assess functional outcome, however, in

stroke rehabilitation.

METHODS: Questionnaires were sent to 26 hospitals discharging patients with stroke and 52 primary care health services treating stroke patients at home, within an area with a population of three million. Questionnaires were targeted at healthcare professionals who typically take part in home-based stroke rehabilitation asking: "Which instruments, outcome measures or tests are commonly used to describe functioning in persons with stroke?" Instruments routinely used to assess functioning were

assessing is a common process [6] and ensuring routine use of standardised instruments in clinical practice can be challenging [3]. Several studies on standardised instruments in stroke exist, but none have specifically considered the transition from hospital to home-based care, and recommendations from clinical guidelines are vague [4, 5]. A standard set of patient-centred outcome measures after stroke suggests that a minimum set of functioning data should be collected at discharge, either from clinical data or via provider reporting [6].

Aarhus University
2) DEFACTUM, Central
Denmark Region
3) Hammel Neuro-
rehabilitation and
Research Centre,
Aarhus University,
Denmark

Dan Med J
2018;65(10):A5500

[Go to:](#) 

prognosis;
is to
is

Julie Mackenhauer, MD  , Erika Frischknecht Christensen, MD , Grethe Andersen, MD, DMSc , Jan Mainz, MD, PhD , and SørenPaaske Johnsen, MD, PhD  [AUTHOR INFO & AFFILIATIONS](#)Stroke • Volume 53, Number 11 • <https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.122.038591>

Flere informationer

- ▶ Tid fra symptomdebut til indlæggelse
- ▶ Indlæggelseslængde
- ▶ Komorbiditeter, herunder psykiatriske diagnoser
- ▶ Ethnicitet

Figur: Genereret med Copilot
september 2024



Potentiel betydning

- ▶ Selvom ulighed nok allerede starter før patienten rammes af stroke, så er en genoptræningsplan adgangsbilletten til genoptræning efter udskrivelse!
- ▶ Identificering af patientgrupper med høj risiko for suboptimal behandling både før, under og efter det akutte forløb
- ▶ Øge sundhedspersonalets bevidsthed om disse patientgrupper
- ▶ Bidrage til strategier for at reducere uligheder på stroke området



Tak for jeres tid!

Spørgsmål?

Kontaktinformation:

- Maja Thaarup
- majathaa@dcm.aau.dk
- Dansk Center for Sundhedstjenesteforskning, Klinisk institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital



Stræk



Snak



Smil